

## Liste des essences locales recommandées en Mayenne

Liste des essences (il est recommandé de mélanger trois espèces minimum par séquence de plantation)

### HAIES

#### HAUT- JETS

Alisier torminal (*Sorbus torminalis*)  
Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*)  
Bouleau verruqueux (*Betula verrucosa*)  
Bouleau pubescent (*Betula pubescens*)  
Charme commun (*Carpinus betulus*)  
Châtaignier commun (*Castanea sativa*)  
Chêne pédonculé (*Quercus robur*)  
Chêne pubescent (*Quercus pubescens*)  
Chêne tauzin (*Quercus pyrenaica*)  
Chêne sessile (*Quercus petraea*)  
Cormier (*Sorbus domestica*)  
Érable champêtre (*Acer campestre*)  
Érable plane (*Acer platanoïdes*)  
Hêtre commun (*Fagus sylvatica*)  
Merisier vrai (*Prunus avium*)  
Noyer commun (*Juglans regia*)  
Orme champêtre (*Ulmus minor*)  
Orme lisse (*Ulmus laevis*)  
Peuplier noir (*Populus nigra*)  
Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*)  
Poirier commun (*Pirus communis* subsp. *pyraster*)  
Poirier franc (*Pirus pyraster*)  
Pommier sauvage (*Malus sylvestris*)  
Prunier sauvage (*Prunus domestica* subsp. *insititia*)  
Saule marsault (*Salix caprea*)  
Sorbier des oiseaux (*Sorbus aucuparia*)  
Tilleul à grande feuille (*Tilia platyphyllos*)  
Tilleul à petites feuilles (*Tilia cordata*)  
Tremble (*Populus tremula*)

#### ARBUSTES

Aubépine à deux styles (*Crataegus laevigata*)  
Aubépine monogyne (*Crataegus monogyna*)  
Bourdaine (*Rhamnus frangula*)  
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea* subsp. *sanguinenea*)  
Églantier (*Rosa canina*)  
Épine noire (*Prunus spinosa*)  
Fragon (*Ruscus aculeatus*)  
Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*)  
Genévrier commun (*Juniperus communis*)  
Houx (*Ilex aquifolium*)  
Néflier (*Mespilus germanica*)  
Nerprun purgatif (*Rhamnus cathartica*)  
Noisetier commun (*Corylus avellana*)  
Osier à bois jaune (*Salix viminalis*)  
Saule blanc (*Salix alba*)  
Saule roux (*Salix atrocinerea*)  
Sureau noir (*Sambucus nigra*)  
Troène commun (*Ligustrum vulgare*)  
Viorne lantane (*Viburnum lantana*)  
Viorne obier (*Viburnum opulus*)

## VERGER À HAUTE TIGE

*L'assemblage des variétés consiste à mélanger plusieurs types de pommes pour l'obtention d'un cidre équilibré et harmonieux. L'assemblage ou « Pommage » apportera la richesse aromatique des différentes variétés mises en œuvre, l'équilibre gustatif (le sucré-l'acidité-l'amertume) et facilitera aussi la future clarification haute du moût avec notamment la formation du chapeau brun.*

*Les 4 catégories de pommes sont :*

*Pommes douces 25 à 30 %*

*Pommes douces-amères 40 %*

*Pommes amères 25 %*

*Pommes acidulées et/ou aigres 5 à 10 % dont 2 à 5 % max d'acide et/ou acide aigre.*

### POMMIERS À CIDRE

Frequin rouge (amer)  
Bedan (douce-amer)  
Binet rouge (douce-amer)  
Bisquet (douce-amer)  
Damelot (douce-amer)  
Marie-Ménard (amer)  
Petit jaune (acide aigre)  
Rouget de Dol (acidulé)  
Telloire (douce-amer)  
Frequin blanc (douce)  
Douce Coet (douce)  
Judor (acide)

### POMMIERS À COUTEAU

Cafernanty  
Drap d'or / Chailleux  
Gros locard jaune  
Reinette de mans  
Groseille  
Reinette dorée de la sarthe  
Rosa de la Mayenne  
Belchard  
Patte de loup  
Reinette clochard  
Pépin Meunier  
Rébillard  
Frémy  
Pépin Coignard  
Belle Ente  
Boutigné  
Pépin d'Or  
Bénédictin  
Reinet Blanc

### POIRIERS

Poire du curé  
Contesse de Paris  
Conférence Beurré hardy  
Giroufle  
Bonne louise d'avranche  
Williams  
Doyenné du comice  
Doyenné d'Alençon  
Jules d'Airoles  
Président Héron  
Marguerite Marillat